

Інструкція з використання Revalife®

Склад: метилсаліцилат 7,5% ментол 5%, N-ацетилглюкозамін, глюкозамін, коноплина олія, арніка гірська етанол, ізопропілпальмітат, метилпарабен, мононатрійфосфат, N-ацетилглюкозамін, полоксамер 407, пропілпарабен, соєвий лецитин, токоферілацетат (ацетат вітаміну Е), вода USP.

Revalife® крем для полегшення проявів артриту з глюкозаміном. Рекомендується застосовувати **Revalife®** до напруженого або розтягнутого суглоба принаймні двічі на день, щоб пришвидшити відновлення вашого здоров'я.

Зменшення болі є хорошим показником ефективності **Revalife®**. Ще кращою мірою, але дорожчою, буде періодичне проведення МРТ тканин уражених суглобів до та під час використання **Revalife®**.

Revalife® тимчасово знімає неінтенсивний біль у суглобах і м'язах, пов'язаний з: артритами, бурситами, тендинітами, розтягненнями, наривами м'язів, сухожилів та фасцій.

ОА Порада 1: Рекомендується спочатку використовувати **Revalife®** лише на одному з суглобів, уражених остеоартрозом (ОА). Наприклад, якщо у вас уражені обидва зап'ястя, використовуйте **Revalife®** тільки на праве зап'ястя, та не використовуйте на ліве. Застосовуйте протягом двох, а краще- чотирьох тижнів. Наприкінці цього часу ви зможете легко визначити ефективність **Revalife**, порівнюючи відчуття у правому зап'ясті з лівим.

ОА Порада 2: Остеоартроз викликаний тим, що організм НЕ регенерує стільки ж хрящової тканини, скільки втрачається регулярним щоденним «зношуванням» у суглобах. Болі в суглобах є хорошим показником того, що ви втрачаєте більше хрящової тканини, ніж ваше тіло заміщає. Та ще кращою мірою, яка використовується в багатьох дослідженнях, є визначення «проміжку» між суглобами: рентгенівське дослідження ураженого суглоба робиться на початку використання **Revalife®** та після застосування крему протягом кількох місяців. Вимірюючи відстань між суглобами, ваш лікар може визначити – чи лікування зупинило втрати хрящової тканини (відстань між суглобами не змінилася або навіть зменшилась), чи ні.

Формула Revalife® захищена двома міжнародними патентами та двома патентами США.

Умови зберігання: зберігати при температурі від +20° до +25° при щільно закритій кришці.

При вагітності або лікуванні груддю перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.

Зберігайте в не доступному для дітей місці.

При потраплянні в ротovu порожнину зверніться за медичною допомогою в спеціалізовану установу.

Застереження:

- Уникати попадання прямих сонячних променів;
- Тільки для зовнішнього застосування
- Використовувати тільки за призначенням
- Не щільно перев'язувати або не використовувати з нагрівальною пов'язкою;
- Уникати потрапляння в ротovu порожнину, очі та слизові оболонки;
- Не наносити на рани або на ушкоджену, роздратовану шкіру.

Припиніть використання і зверніться до лікаря, якщо:

- Стан погіршується;
- Симптоми зберігаються протягом 7 днів або проявляються/ повторюються протягом декількох днів.

Застосування у дітей: можна використовувати дітям з 12 років.

Показання: підвищена чутливість (алергія) до будь-якого з компонентів засобу; *особливо якщо є алергія до саліцилатів (включаючи аспірин).*

Маса нетто: 114 г.

Виробник: Інтернешинал Натрасютікал Компані оф Амеріка, 4445 Стонінгтон Сьоркл, Атланта, Джоржія, 30338, США.

Заявник експертизи: Приватне підприємство ТОРЕС-Н, Україна, 09000, Київська обл., м. Сквиря, вул. Макара Чижика, 32, Тел./факс +380459491305. Код ЄДРПОУ або національний номер заявника експертизи 33689605.

Висновок держ. сан-епід. Експертизи № 602-123-20-3/2853 від 07.12.2016